

Пиндани, Псевдотрофеус Соколофи , голубой пиндани (*Pseudotropheus socolofi* Johnson, 1974)



Интереснейшая цихлида озера Малави . Встречается на скально - каменистых рифах озера, заросших водорослями. Параметры воды dH 8-20°, pH 7,2-8,5 с большой прозрачностью.

АРЕАЛ. Восточное побережье.

ВНЕШНИЙ ВИД. Длина: самцы — до 12 см, самки — до 10 см. И те, и другие окрашены одинаково. Тело удлиненное, вальковатое.

ПОЛОВЫЕ ОТЛИЧИЯ. Самцы крупнее самок и имеют развитые анальный, спинной и брюшные плавники.

СОДЕРЖАНИЕ. Полигамные, уживчивые. Аквариум от 100-150 л. Укрытия — «риффы». Фильтрация, аэрация, еженедельная подмена до 30 % объема воды.

ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ. Жесткость 8-25°, pH 7,2-8,5, температура 24-27 °C.

КОРМ. Живой, растительный (60-70%), комбинированный.

РАЗВЕДЕНИЕ. Половозрелые с 9-12 месяцев. Продуктивность 25-90 икринок. Самки инкубируют икру во рту 17-22 суток. Стартовый корм: науплиусы артемии, циклопа и т.д. Возможна искусственная инкубация.

Цвет самцов и самок голубой, мальки окрашены темнее. Созревают после 10 месяцев. Размер взрослых самцов до 12 см.

Питаются смешанными кормами, где 60% - растительные и 40% - животные. Корма лучше использовать мороженные, морепродукты, циклоп, немного мотыля. Из растительных кормов дается салат, а также тыква, крапива, одуванчик, которые несколько минут варятся. Можно кормить сухими кормами SERA , TETRA, в составе которых содержится морская водоросль спирулина.

Температура воды в аквариуме 22 - 28°C, оптимальная 24 -26°C. Подмена воды не менее четверти в неделю.

В аквариуме лучше использовать некрупный грунт, камни и гроты. В аквариуме желательно использовать ракушечник или кораллы и коралловый бой. Размножение происходит в общем аквариуме. Самцы занимают довольно большую территорию дна, предпочитают положенные на бок цветочные горшки, плиты. Самки забирают икру и молоки в рот, где и происходит оплодотворение. Держат икру и личинок три недели. Чтобы получить мальков лучше использовать отсадник с большим количеством камней или инкубатор.

Выкармливание артемией, измельченными мороженными кормами, Тетрамином. При содержании желательно присутствие сомиков прилипал, некрупных и нехищных синодонтов и улиток. Растения с жесткими листьями (анубиасы, больбитисы, эхинодорусы) сажаются и прижимаются камешками.