

Фонарик, тетра-фонарик (*Hemigrammus ocellifer*)



Семейство Харациновые (Characidae).

Фонарики в природных условиях широко распространены в Гвиане и в бассейне Амазонки. В Европу эти рыбки впервые попали в 1910 г., а в Россию были завезены в 1959 г.

У фонарика тело вытянутое серовато-серебристого цвета, с более светлым брюшком и темной полосой по бокам, переходящей в черное пятнышко на хвостовом плавнике. На конце хвостового стебля, сверху расположено светящееся пятно золотисто-оранжевого цвета. Второе пятно (не всегда четко видно), находится за жаберной крышкой и над глазами. Именно благодаря этим светящимся пятнам фонарик и получил такое название. Плавники у него бесцветные, на анальном имеется колючка, которой он может уцепиться за сачок. В длину тетра-фонарик достигает 5-6 см. Самец стройнее и мельче самки. Самка отличается более полным брюшком и положением плавательного пузыря, видимого на просвет.

Фонарик - одна из наиболее популярных мелких тетр, великолепно подходящая для общего аквариума с другими мелкими харациновыми, сомами и карликовыми цихлидами. По характеру это миролюбивая, стайная и выносливая рыбка. В аквариуме обитает в верхних и средних слоях воды.

Содержат фонариков в аквариуме емкостью от 50 литров, густо засаженном растениями и некоторым свободным пространством для плавания. Грунт а аквариуме желательно темный. Содержать фонариков лучше стайкой (не меньше 6 особей).

Температура воды для содержания фонарика 20-25 °С. Параметры воды: жесткость до 18°, рН 6,5-7,0. Необходима аэрация, фильтрация и еженедельная подмена воды до 25% от всего объема.

Кормить фонарика можно живым и сухим кормом, желательна растительная подкормка.

Для нереста фонарика необходим аквариум емкостью 20-25 литров, засаженный мелколиственными растениями и уровнем воды 20-25 см. Жесткость воды до 8°, рН 6,2-6,8, температура 26-28 °С. Воду перед нерестом необходимо обогатить торфяным экстрактом. В аквариум сажают одну самку и двух самцов (за 5-10 дней до нереста их отделяют перегородкой и усиленно кормят живым кормом). Нерестятся, как правило, на растения или на дно. Плодовитость до 500 икринок. После того, как самка фонарика закончила выметку икры, производителей убирают из аквариума. Инкубационный период длится 24-36 часов. Оплодотворенная икра обладает прозрачной оболочкой, неполноценная мутнеет через 6-12 ч. Для лучшего развития икры необходимо затемнять нерестовик. Плавать и питаться мальки фонарика начинают через 5 дней. Кормят их коловратками и инфузориями.

Половая зрелость у фонарика наступает в возрасте 6 - 8 месяцев.